

応援派遣に際しては、介護施設がエアロゾル感染のリスクが高いことへの十分な配慮が求められる



賢治画

- 介護・施設⇔密接(密着)・密集
 - 食事や排せつ、入浴の介助
- 認知症という障害
 - マスクを外してしまう
- エアロゾル発生場面が多い
 - 口腔ケア
 - むせ込み(食事介助時に限らない!)
 - 孤立や介護不同意、難聴など→大きな声の訴え
 -
- 個室にとどまれない人
 - 介護施設の構造(共有スペースへの導線上に個室を配置)
- ふれあいを大切にする介護の文化



受援施設における陽性者の発生時期(詳細が把握できた事例のみ)

		支援以前	Zoning指導後 (Zoning開始日を0日目)		介護の応援開始後 (応援開始日を0日目:Zoning指導から 8日目が2施設と13日目が1施設)	
			0～7日目まで	8日目以降	0～7日目まで	8日目以降
介護の応援なし (11施設)	職員	7	19	4		
	利用者	31	43	11		
	計	38	62	15		
介護の応援あり (3施設)	職員	15	10	9	6	2
	利用者	17	9	2	1	1
	計	32	19	11	7	3
受援施設 (14施設)	職員	22	29	13		
	利用者	48	52	13		
	計	70	81	26		